

**DE PERIOSTITIDE
DISSERTATIO
INAUGURALIS ...
MENSE FEBRUARII
1847 PUBLICÆ...**

Francesco Introzzi



DE
PERIOSTITIDE

Dissertatio Inauguralis

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE RECTORUM ACADEMIE
 MEDICAE, AD PRÆSENTIUM FACULTATEM MEDICAM
 UNIVERSITATIS MONACENSIS SUB NOMINE CANDIDATI
 MEDICI PRÆSENTANDO PRO DOCTORATU MEDICÆ LITTERÆ
 PUBLICE IN MUNICIPIO MONACENSIS AD PRÆSTANDUM
 AUCTORITATIS IN OMNI PRÆSTANDAQUE CALAMITATE
 UNIVERSITATIS MONACENSIS

ADPRÆ

D. DOCTORE THEODORO HELM

*Clinicus Medicus Therapeuticus Specialis Prof. O.
 Decanus Facultatis Universitatis ab anno*

CUM ADIUTUS TERTIUS DEPENDENS

Monaci Februarii 1847

PUBLICÆ DISCUSSIONI OFFERENT

INTROZZI FRANCISCUS
 MEDICUS



TRIBUNI REGII

EX TYPOGRAPHIA FUM ET SOHL



Quæritur quia mundus præsit

Sed Philosophia res rursus, ad parvas partecis ad aliquid
quærit res universales, non plures præter, quæ mundi
sola est Metaphysica, quæ ipse est mundus.

Quæritur An. 100.

Difficile est, ut, qui bene sit, non in malis possit,
quædam vultus præter ignorando, quædam vero male
judicando, et quædam tunc neglectum utique de-
derit.

Galileo, de Corpore. Metaph. I. II. a. B.

CAROLO ET ROSAE INTROZZI

FABRICIUS ABSTINENS OPTIMO SYNERGUS

DES TRIPLES PRIMITIVAS

MEDICINAE ET CHIRURGICAE

LEONARDI MEDICUS

DEI ET CONSENTITUR

ORIENTALIS ORATIO ANNI

ACQUIESCENTUR

Epithetorum Filius.

FRAGMENTUM.

Perantiqua viget lex, quod, persoluto studiorum curriculo, quisque candidatus, ut Medicinæ lauream consequi possit, aliquid sui in lucem edat.

Ut igitur huic muneri adimplem, statui discernere de illa aegritudine, quæ Periostitis nomine insignitur.

Siquid, benevole lector, corrigendum invenies, meum virium imparitati adscribas, dum experientia et observationibus careo; nam uti sapientissime monet celeberrimus Zimmermann « l'expérience et le esser-
» vationi sono la base dei nostri ra-
» gionamenti ».

Vale.

PARS PRIMA

Perionthitida vocabulum a fonte graeco sum-
 ductū originem, videlicet a vocibus *σφα*
 (spha) *σφα* (sa) et consona phlogo-
 nis desinentia *ιτις*, atque indicat perionthi
 inflammationem.

Quoniam hujusce morbi cognita usque
 ad syphilidis apparitionem adveniat, attamen
 ejusdem infima conditione pathologica co-
 habendo potius quam Doctor Crampton eam
 descripsisset, invenit.

Symptomata characteristica hujusce afflictio-
 nis eriri possunt non tantum a syphilde,
 verum quoque a scrofula, scorbuto, nec non
 ab una lemedica mercurii alteraque me-
 dicamentum. Nonnisi vero hanc supri-
 tando a frigore inducitur, eo magis si malum
 sum infirmum exerceat post mercurialis sub

adversis circumstantiis adhibita, atque in hoc ultimo casu saepe confunditur cum epiphila. Facili negotio quoque confundi potest cum aliqua neuralgia aut scissura, potissimum quoties ad illi caput in uno tantum latere, vel exacerbationes patitur ad horas plus minore delatas, praesentem vaspartinae. In epineuricibus medicis nonnulli eas referunt, in quibus praeterea etiam suppositurae auris praeparatae, ipsaque chimica ad tantumque dolores, qui caput adgredebantur ex uno tantum latere, et ab inflammatione periculi dolores praesidebant.

Quamquam periculis vocabulum phlogosum periculi volumendo exprimet, raro tamen observatur inflammationem circumscriptam esse ad hanc membranam, dum plerique in casibus casum tantum quoque altera observatur; quod una ipsa periculi phlogosis quoadque ab casibus ipsis supposita incipit.

Peculiaris hujus membranae argumentum ita agit, ut speciali ratione modificetur symptomata, a quibus ipsa inflammatio concommitatur. Quamquam haec involucrum fibrosum modiciter esse sit, utilitatem est validissimam ac parum cadit ex hoc evenit, quod saepe ab ejusdem distentionem dolores

scallentia habentur quare non adeo ut
gravis inflammatio interiorum dolor lancinans
se ostendens inanghi, quamquam externe fere
nulla alteratio localis adpareat: e contra non
raro minimam est, tumori externe altera-
tiones magis manifeste conspiciuntur.

Satis ab experientia comprobatum est pe-
culiarem decurrendi modum patolice, vi-
delicet hunc raro perististilem uno eodem-
que tempore vel successive adgredi partes
osium extremitatum sibi respondentes, aut
latera que eadem congruunt partem juxta
lineam medianam. Propter hanc causam si
negligente sedem tuam sicut in aliquo pun-
cto scapulae brachii aut osium antibrachii,
non raro observatur, quod symptoma co-
dapi tempore vel parvo post diutius evol-
vatur in scapula aut in ipso osse lateris
oppositi: ita si elicitur clavicalis ulnus lu-
teria, paulo post in comparietatem ducitur
ille alterius. Perististile adgredi queit cuncta
ossu corporis humani, sed prædilegit ille
crania, scapulam, sternum, femora, tibiae.
Si evolvitur in sterno, cricem aliquando gi-
gat hujusce ossa, que postea externe viam
sibi parit, episternale plagi plus minore di-
versa, atque sub cordis motibus et respi-
ratione plerum ab ipso pax vero committitur,
quod peculiari ossu concomitatur. 4°

Pericardium, quae sedem suam ponit circa articulos, saepe extenditur ad ipsos, includendo pericardiacum aethrium; tali ratione a libis fœlli negotio procedit usque ad genus, vel ad crura articulationum; atque ab humero vel scapula ad illam humeri; articulus sternalis claviculae sedem hujus morbi praedilectam constituit; inter latera scapulae percipit partem anteriorem prope sternum vel cartilagineam intercostalem, nonnunquam inducendo costarum crura. Ubi vero sedem suam in eum habet phlogosis fore semper indicat partem medianam vel inferiorem, atque generaliter in superficie anteriore ac interna. Alia proprietas hujus pericarditidis formae est in difficultate eam lenire, et eo quod adhuc dum ignoretur methodus congrua ad componendos dolores saepe artificiales, quibus condatur.

Inter formas magis notas, habito respectu ad dolorem acutum, principum tenet locum pericarditis capitis, quae in tres species conjugi potest. Primum scilicet dignoscitur, quia pericarditidis semper praebuit tumorem durum, dolorem tactui, et quae utpote a costis capitis, quae nunquam deficit, diffundi videtur. — In altera specie dolor obtusus est, usque ad pericardium aliquod coherescit;

afflictiones hanc deficit parte comitas immittas, quæ morbi naturam detegit; imo quia occupat locum distinctum, inflammatio nonnunquam diffusa est ad crani latera, ac istidem doloribus diversitas consociatur. — Obscurior erudit diagnosi in tertis specie; agrotus ex. gr. comperitur de capitis dolore sicut maledito, qui ab exordio intermittit, atque sub vespere exacerbationes patitur, prosterantur vires, et cephalice delirantem oculis prebet languentes, suffusos, lacryisq; conspersos; neque doloris sedem rite distinguere valet ex eo quod modo ad frontem modo ad capitis latera illam accusat: tactus nec non tenditatem detegit, neque duntaxat in aliquo puncto parte erigitur. — Ager per aliquod tempus in hoc statu consistit, postea somnus valitius incipit, horriores ac minus manifestas sunt remissiones, atque dolor semper increvit: de die tollerabilis est, sed vespere illam intensitatem gradum acquirit, ut omnia somnum auferat; neque emolumentum sunt generosiores opio dems, aliorumque narcoticorum: hirudines quoque et veræ sectiones manuali leve ac fugax levamen producant. Uque a primis visitationibus medius parat, qui de aliquo morbi affectione et propterea methodo au-

Sphragistica videtur, donec ejusdem levitas quoad diagnosis dubitationem reddat. Quia hic in aliquibus casibus hujusmodi species (in qua capitis integumenta omnia reformidant tactum, et dolor circumscriptus est ad partem tantum lateris) evolvitur nonnunquam phosia partialis unius palpebrae, quae in magnam inquietudinem medicum infert, potius fore agi de aliqua affectione capitis idiopathica. Phosia vel proidentia palpebrae superioris symptoma constituit valde frequent in affectionibus cerebrellis; proindeque in capitis congestionibus, in neuraliis febribus, atque in pluribus aliis morbis, utpote medi omnino habetur. In nostro casu videtur procul dubio paralyticis species, sed haec simpliciter secundaria est, neque pendet a cerebro, potius a nervorum lesione: propter hanc causam hoc symptomus in genere parum notum hunc magis momenti est in periorbitide, de qua loquimur. — Ratio, quae hic morbus difficile dignoscitur atque ex tactu raro sensibilitatem abnormem praebet, in eo adest, quod videtur eam habet in superficie oculi in interno: ideo aliquod tempus requiritur ut se praebet. Et rursus elapsis octo vel decem diebus, in quibus frustra medicus conatur dolorem compescere, sub tactu in regione

eredita invenitur paucius saltem, qui dolens est, et tunc morbus uti in praedictis speciebus adspicere creditur.

Periclitia enim aliquando formam chronicam inducit, imo eodemque tempore magis cum discrimine adgrediendo lumen tam externam quam internam uti observare potuit Doctor Graves in paucis convolutionibus chronica, quae cupitis periclitide laborabat et agebatur de terribili adfectione imminente, cui res opposuit, substituendo magis cum emolumento haud terribes mercuriales doses.

In periclitide ferocia valde difficile ab exordio credit, tranquillitatem diagnoscere, a qua excitatur, habito respectu ad eam altitudinem; propter hanc causam et potissimum ab positionem hanc affectio nonnunquam confusitur cum neuralgia, lachrymatio. Attamen tranquillitas paulo post facile detegitur, uti interea segis diuturnior dolores paucis est, nec non distinctas vigilias in cubiliis chronicis. Nonnulli Majoris Medicinaria non desunt exempla hujusce naturae.

PARS SECUNDA

Pericostitis sejungi potest in duas species, videlicet in diffusam et circumscriptam. Prima ad forum chirurgicum pertinet et sere semper constituit symptoma secundarium antiquae affectionis venereae, vel se praebet sub forma utroque functionis vicariae propter imperfectam vel deficientem menstruationem in feminis. Altera, sive circumscripta et se quod plerumque nunciat levem plagam tenet, aliquando ardet per triginta, adplicatione, ab violentiis traumaticis, quae interdum non observantur ab aegro; sed plerisque in casibus pendet ab aliqua causa sic dicta specifica, ut mercuriana, scrofala, chlorica, scorbutica, anaemicae etc. Haec frequenter in pectus occurrit, atque plura varietates praebet. Interdum existit quae pericostium ab eae subposito sequentem fit, quae in casu propter phlogosin pericostium laesum, dum ea spongiosum fit et volumine augetur, sub hoc modo nudi decurrit vehementer validius evadit compressio inter per-

ita, reliquis enim peristoma vixit incrementum ac progressu temporis tantum con-
stat, qui sub tactu cum oculo confundi po-
test. Sub hac morbi periodo pars tunc et
dolens est, quin imo tumida, atque exis de-
color interdum observatur; viliatibus pe-
detentis symptomatum intensitas immutatur;
dolor decrescit, aut omnino non adest, pe-
ristoma majorem crassitiem adipiscitur, et
nonnunquam adspicere praebet tractus fibro-
si-cartilaginei: aliquibus in casibus et mor-
bus congruis tractatur medela albae resolu-
tionem adicit; sed in plerisque si peris-
toma ad hoc statum pervenit, per totam
vitae curriculae manet, vel in ipsam sub-
stantiam, osseam convertitur. Rursus pecu-
liaris est decursus hujusce morbi: ossifica-
tio incipit in alia peristoti lappenti, atque
massam osseam circumscriptionem praebet, quae
in superficie oculi sub pedis erigitur. Pro-
gressu temporis lamina externa oculi proprie-
tatem absorbetur et massa ossea continua
cum illo fit, in quo species oculi effluunt.
Quando hac affectione corripiuntur diversae
partes ejusdem oculi, haud levis turpitudine
exurgit, quaeque eorum constituit promi-
nendas papillas et irregulares, quae oculum
cavitates naturales implent, ita ut saepe ab-

que tantummodo vestigia retinent primitivæ conformationis: id quod æquidivertus præsertim in illis individuis lymphaticis.

Alia forma peritonitidis est illa, in qua videlicet peritonium adjungitur à superficie cæci, et pariter non parum præbet varietates. Nequaquam intra octiduum, octo vel decem dies, in partem quancunque cæci erigitur contentis dolens pressum, quæ tactu duntaxat præbet consistentiæ substantiæ, sed diligenter contenta aliquæ elasticitatem detegitur. In secunda periodo hæc varietas tumiditas et dolor paulatim evanescunt; tandem, quod antè peritonio effusum erat, absorbetur, et membrana primitivam elasticitatem cum cæco recipere: hæc omnia modo citius, modo serius disparent. — Hujusmodi tumores sunt illi tumores, qui evolvuntur et evanescunt magis cum celeritate in cæco et affli; tumores, qui antè singulis constitutionibus topica et revulsivis citius solvantur, et postea quam per ossuallas hæbdomadas aut menses continuaverint, hæc aliquæ reliquunt vestigia progressus extinctionis. Hæc varietas necesse est dicitur cæci cancerosa; statum in aliquibus casibus liquidam intervallum superius attingens cepit ad superficiem cæci determi-

est, atque temporis progressu viam sibi parat exire, opitulante ceteris exulceratione, ac natum deinde granulationis ope sanationem pergit, quae incipit in superficie oris vesiculosae, connectitur cum granulationibus peristitii et integumentorum, quae per partem substantiae pectoris reparant. — In aliis varietate per colligitur sub peristitio, et superficie oris respondens huic puncto colligitur, oris in exulcerationem abdit, et sanatio perficitur sicut in eam praedicta.

Aliquando pars, in sequestro posita, minime una vice expellitur, sed perforata (probabiliter abortiva ope) granulatione curante in forum introducitur, et sanatio eam destruit. Haec sunt praecipue varietates peristitidis; habetur vero et alia, quae a aculeis inducitur, sed quoniam ea una cum peristitia semper colligitur sit, quisque videt, quod cum hoc nomine aculeus insigniri debeat.

Sicuti jam observatum fuit, peristitia nisi semper, saltem plerumque in casibus inducitur a quibusdam substantiis, quae a nonnullis dicuntur veneficae, ut essent hydrargyrosi, scrofule, syphilis, scorbutus. In cuticula obstrigida saepe opportunitas habetur discernendi symptomata pathognomonica for-

non a cerebula pendencia. Generationi ipsæ se præbet cum phænomenis non adeo gravibus, et sæpius in pueris occurrît, in quibus raro syphilis totam vitam infusam exerceat, vel mercurialis utatur. Attamen quoties hæc affectio evolvitur in ætate magis prævicta, difficile sæpe crediti statueri se pendere a mercurio, vel potius a syphilide, cerebula aut alia nota vel possibili causa. — Si namque periclitide laborans, mercuria usque est ad debellanda symptomata primitiva et secundaria syphilitica, et recrudescat; si post octo vel quindecim dies aut etiam post mensura frigori atque humiditati se exponit, et periclitide uno eodemque tempore evolvitur in diversis partibus aut partibus symmetricis membranis, tunc rite indolis mercurialis haberi potest. Causa adhuc difficilior illi est, in qua supponi potest, duas diversas causas lesionis egisse: aliquando occurrunt individua scabie, quæ sæpe affectionibus syphiliticis obnoxia sunt, et plurimum mercurii præparata adhibuerunt, usque a longo tempore hydrargyrium in vitam vivebatur. Robert Graves, quod in Nosocomio Dublino Læte arbitrabatur aegrum syphilide detentum in sanitatem alios quoties in die plures salvas libras expulsi!

PARS TERTIA.

~~capitulum~~

Rariora Perlaesthida communiora sunt: Denudatio ossis vel plagi, necrosis, caries, exostosis, spina ventosa, pericostosis vel gumma, osteosarcoma, ossalis atque fragilitas.

Denudatio ossis contingit quando appositione pericosti evanescit et partem molliam illud obducuntiam, quodam externam superficiem appellat.

Necrosis, vel mors vitæ: hanc temporalem hoc vocabulum significacionem habet citius extinguitur quæm vita, et eo citius solenniter ad denotandum mortem partis ossium magis conspectæ, ut esset diaphysis humeri, tibiae, humeri, etc.; rursus cum complicata adgreditur, excepta parte petrosa ossis temporalis.

Caries e contra est mors illorum ossium, in quibus prævalet substantia diploica, ut in ossibus planis et irregularibus. Iste exitus in ossibus cylindricis coarctatur subiacendo ad caput articulare.

Exostosis constituit tumorem ossium, plus

ministrare cutis, qui in una tantum parte, vel in toto eam involvitur.

Species eructos, vel affectionem propriam cuiusdam cylindricum efformant, in quibus parietes cutis medullaris lentum subeunt et successivam distensionem; aliquando enormem, eodemque tempore ipsae quam maxime attenuantur, ac porredebantur pluribus in locis, eorumque textus videtur medullarem peculiarem subire; affectio, cujus sedes probabilis statim cortex medullaris cuius ipsae.

Periostosis vel paroma hoc nomen recipit ab aetologia, quam ostendit cum hunc a quibusdam rheumibus plerumque, in eam facile solubile. Hic cutis ab aliquibus auctoribus cum anastasi fuit confusa. Repugnandi affectio consistit in obstructione, quae in sinu textus prope periostem, evolvitur ac committitur ab alteratione speciali hujus membranae, et consequens a morte hominis superficialis eam ipsam. Periostosis ut plurimum evolvitur in cutibus plenis, in parte magis compacta cuius oblongorum, nec non in involvere dictorum, quae minus a partibus mollioribus defenduntur, ut in regione capilli crinita, et potissimum in fronte, ad partem temperatam anteriorem, ad superficiem

anteriorum sternali, in regione externi radii, in interna cubiti, ad tibiam.

Osteoporeosis deditis quoadmodum observatione testatur, ut postea quam majorem vel minorem partem sit distensionem, substantia coe-lescens degeneret, ac in locum novae formationis convertatur, plus minusve illi canceri affinem, dum symptomata localia et generalia aequam similitudinem cum illis partibus affectis praebent.

Essentia rariorem Perianthidia etiam constituit. Tunc se fœdi negotio incarvatur, nec non fœditur propter ablatam aequipondiam inter elevata illud constituenta, videlicet propter defectum phosphatis calcis et relativam gelatinae exuberantiam; moxque fœdit in infamia.

Fragilis vitium antecedenti oppositum, ac praebet cum immixta acie elasticitate ita ut sub minima vires resurgatur. Haec segritudo, quae aequalitate vires acies apphida labefactatur, nam aequitatem in adiecta copia substantiae calcareae cum gelatinae defectu.

THERAPIA.

Cum Pericarditis post causam ablationem aut inflammationem esse debet generalis et localis.

Topice, si morbus recessus est et phlogosis circumscripta magna utilitates præstant: sanguinis evacuationes locales, cataplasmata emollientia et anodina, et tali pacto prædisponatur systema ad specificorum effectus magis sentiendos. Nonnulli vident quoque adplicationem unguenti adnase, resolecentium, anaplastorum, et friccionem cum tartaro vitellato etc. Sed, ut sapientissime monet Boerhaave, si hæc auxilia aliquibus in casibus tanquam solventia ac resolventia utilitatem præstent, aspiens vero periculo non desistantur, propter inflammationem quæ evolveri potest: quæ de re, uti unicuique patet, morbum prevenire aut profligare auxiliis interioribus curari debemus. — Loco adfecto ideo quotidie admoveiri oportet linimentum camphoratum et paribus sequentibus exornatum unguis, saponis medicatissimi vel alias substantiis pinguis cum terribus mercurii metallici, vel si indicetur cum parvulo etiam hy-drochlorato ammoniacæ, ut promoveatur ab-

sortis. Ad validiorem sedandam ejusdem actionem, consilii proponunt emulsionem unguenti clausi cum jado puro vel hydro-jadato potasse. Sequentes formulas in usum vocari possunt:

Formula simplex.

℞. Linimenti mercurialis drach. duas.

℞. S. usui externo pro act. trichomibus.

Formula composita.

℞. Unguenti nupaltani drachmas tres.

Hydrojadatis lixivie ascopulani
m. sat l. art. unguentum.

℞. S. usui externo pro act. trichomibus.

Quoties acutis tempore hanc medicinam applicari volumus, circumspexio haberi debet, nequa via ad partem doli prescribere, quia maxima cum facilitate solvantur aut decolorantur.

Etenim proto-joduretum mercurii et deutero-joduretum hoc sub intitu magno cum emulsionis unguente facit. Ascopulando illorum agendi visum cum illa unguente digne, duas præbent utilitates; primas nimirum maxime cum difficultate phtisiam evincit, et in qua vice prænocent impetigine speciem valde prurientem, cui facile obviatur.

ire possunt cum dysphoretiis interne adhibitis, balneisque adventitiis per unguenta: alia utilitas consistit in majori effluvia, cum ceteris partibus saltem dosis valde minor joduræ mercurii, quam unguenti napolitani requiruntur ad quendam effectum obtinendum. In aliquis females:

- g. Protæ-joduræ hydrargyri drachmam
Hydrochloricæ ammoniacæ grana decem
Axungie villæ depuratae drachmam.
m. f. l. a. linimentum.
D. S. it pro una externa ad quantitatem
vacie nullius pro singula frictione.
- g. Hyduret. hydrargyri scrupul. duas
Muriat. ammoniaci depurati grana viginti.
Axungie villæ drachmam.
m. f. l. ut. linimentum pro una ex-
terna.

Sicuti neminem paræ periculis de-
tente nullum medicamentum leve ferre vo-
let, quia signa ita minuta aut incipiens
inflammationis præbent, et quam
innocentia, ab unguentorum applicatione
necessaria erant, aliquibus intolerabilis eva-
dat: ita ubi contumaci frictionum circum-
scriptæ ad plantam pedis, cum pediluvium

calidum praescribitur, cum unguento ab Huf-
feland commendate, quod ita conficitur :

§. Nictotroci hydragyri

Oblacrosi amantii lepar. ana drachmas.

Ammagiae milleb. unciarum.

m. f. l. a. unguentum.

R. S. pro una externa, et instillatur
duodecim frictions ad pedum plantas.

Quoad curam pericarditidis graudem, ut
resistantur progressui hujusce terribis mali,
si nulla habetur contraindicatio, et tamen
feruntur, deindeleatam erit ad praeparata
hydragyri efficacia, uti ex. gr. ad Bi-
joduretum mercurii. Quoties vero seger post-
sertim nocturno tempore doloribus ostendo-
picis vexatur, ad cyanuretum mercurii con-
suegendum erit. Ut haec duo postrema praepa-
rata magis ferri possit, utile erit illis
addeciat aliquas opi grana, vel melius nulla
morphinae, uti in sequentibus formulae :

§. Buto-jodureti hydragyri grana tria.

Opi thebaici grana duo.

Extracti guttae q. s. ut fiat l. a. mas-

sa pilularis dividenda in partes ae-
quales N. viginti.

R. S. cumat seger nocte omni mane.

g. Nucis sublimati carosini

Solutio morphine ana grana.

Extracti trifoli scirni q. s. ut fiat pilule N. octo.

D. S. sumet unam cum melle.

g. Cyaneæ hydrargyri.

Hydrochloratis morphine ana grana.

Rosæ sambuci q. s. ut fiat l. a. pilule dividenda in partes sequales sex decies.

D. S. sumet unam vespere.

Si autem induruerit pyrosis, segro prescribi potest aliquis potus emolvens et gratus. Ubi vero invisa astringentium admodum prædictæ pilule tantum pondere indicem, eodem præparato suppositari quousque die semel ex. gr. ex solvendo in infusione capilli veneris vel alio potu grato, et tali modo obducitur coram super ingratas vel corrigitur.

Si pericarditis cum arthritide complicetur, pericarditis sanguinis crassioribus guttulis, sanguis cum emolumento utruptis fuerit præparato colubici venalis, et inter hoc consili prædiligant syrupum, cum ali, extractum, lincturam ejusdem colubici. Neque hic locus est fusiùs discere, an methodus hæc unam vel alteram exhibere præ-

pariem; adquemodo veniam licet, quod
 fore indifferens est devenire ad unam potius
 quam ad aliam ex praedictis preparatis,
 dummodo rite perpendatur eorum efficacia;
 habito respectu ad individualum aegri reci-
 pivitatem; exceptis vero finibus colubini,
 quia praeter unam incertam actionem quo-
 que periculosam est de alibaba praesentiam,
 quae aliis ejusdem actionem imitantem
 exultat. Et ego ipse super eorum viâ, in
 quo gravi molestiae villicae robustiori in-
 sumeramus, vel potius vice suppellicatae
 fuerant donec colubini venalis decessum in
 minus duodecim horarum sumamus!

Si hydragyrosi symptomata in aetatem
 profuerint, tunc oportet aetatem per tempore
 mercurialis aetatem suspendere, et substi-
 tuitur aliquid purgare vel rube, una cum
 decoctis diaphoreticis, donec circumstantiae
 aliant, ut rursus cura suscepta coordinetur;
 progressu tempore etiam haec praesternitien-
 da aut, et incipitur sic dicta cura secun-
 daria vel sanguinis depuratoria. Haec con-
 ducit in corrigenda, per quanta possibile est,
 sanguinis crasi, labellata a radicantibus,
 apudictis inebonit proinde cum decoctis sti-
 pitum dolorem et bardane additur potius
 parva copia gustari. — Sed aptior cura re-

